

《ピアッシング 説明同意書》

◆ 施術方法

- ① ファーストピアスを選んでいただきます。(医療用チタン製とプラスチック製があります)
- ② ピアスホールを開ける位置をご自身で鏡を見ながら決めていただきます。
- ③ ピアスホールを作成する部位をアイシングします
- ④ 消毒しピアスホールをあけます。
- ⑤ 自宅での処置方法を説明します。

◆ 注意点

- 数日間は多少の痛みや腫れがでることがありますが、症状が強いときは受診してください。
- ピアスホールが安定するまでの期間は個人差があり、3ヶ月～1年かかります。ピアスホールが安定するまで(早い方でも3ヶ月) ファーストピアスを外さないでください。
ピアスホールが安定する前にセカンドピアスに変えると、トラブル(化膿・出血・腫れ・かゆみなど)の原因になったり、ピアスホールが安定するのが遅くなってしまいます。
3ヶ月～1年以上経ってピアスホールが安定してからセカンドピアスに変えてください。心配な方はずっとファーストピアスのままでも大丈夫です。

《ピアスホールが安定したためやす》

- ① ピアスを前後に動かしたりくるくる回しても違和感なくスムーズに動く
 - ② 分泌液や血がでない
 - ③ 化膿していない
 - ④ 腫れやかゆみ、痛みがない
 - ⑤ ピアスホール内に赤みがない
- ピアスホールが安定していない時期にファーストピアスを外すと、ピアスホールは短時間(ピアスホールをあけて間もないときは数分)で閉じてしまいます。ピアスは入浴時、就寝時も外さないでください。狭くなったり閉じてしまったピアスホールに無理にピアスをつけようとするとう化膿する原因になります。無理につけないでください。
 - ピアスホールは毎日シャワーで洗って清潔にし、触りすぎないようにしてください。

私は今回の治療に関して、その方法、効果、副作用などを理解しました。その上で、この治療方法を受けすることに私は同意いたします。

年 月 日

住所 _____

氏名 _____

(未成年の場合)

保護者住所 _____

保護者氏名 _____